

Nemokamos prevencinės programos

Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa skirta moterims nuo 25 iki 59 metų (imtinai). 25-34 m. (imtinai) moterims kartą per 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinis tepinėlis. 35-59 m. (imtinai) moterims kartą per 5 metus atliekamas gimdos kaklelio aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas (AR ŽPV) ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas skystoje terpėje (jei AR ŽVP tyrimas teigiamas). Gavus tepinėlių rezultatus gali būti atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę.

Krūties vėžio prevencijos programa skirta moterims nuo 45 iki 74 metų (imtinai). Pagal programą kartą per dvejus metus atliekamas mamografinis tyrimas, leidžiantis tiksliai diagnozuoti vėžį ar ikivėžinius pakitimus. Gavus šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, iš anksto užsiregistruojama telefonu II ar III lygio įstaigoje, kuri teikia mamografijos paslaugas. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrams nuo 50 iki 69 (imtinai) metų bei vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. Pagal šią programą kartą per dvejus metus atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršys normą, šeimos gydytojas išduos siuntimą konsultuotis pas urologą.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta vyrams ir moterims nuo 40 iki 60 metų (imtinai). Pagal programą atliekami tyrimai: gliukozės koncentracijos veninio kraujo plazmoje nustatymas, lipidograma, elektrokardiograma, kreatinino koncentracijos veninio kraujo serume nustatymas ir šeimos gydytojas įvertina rezultatus, nustato metabolinio sindromo diagnozę pagal kriterijus, įvertina šeiminių dislipidemijos tikimybę, nustato bendrąją širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę pacientui ir rizikos grupę.

Pacientui, kuriam nustatyta labai didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika, šeimos gydytojas išrašo siuntimą gydytojo kardiologo išsamiai širdies ir kraujagyslių ligų paslaugai.

Pacientas, kuriam nustatoma: labai didelė širdies ir kraujagyslių rizika kviečiamas dalyvauti Programoje po 1 metų, didelė rizika – po 2 metų, maža ir vidutinė rizika – po 4 metų.

Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa skirta nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų silantavimo.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos tikslas – kuo anksčiau nustatyti storosios žarnos vėžį. Todėl kas 2 metus reguliariai turėtų būti tikrinami asmenys, sulaukę 50-74 metų (imtinai) amžiaus nemokamai atliekant slapto kraujavimo nustatymo testą, pagal kurį galima numatyti ankstyvosios stadijos storosios žarnos vėžį. Nustačius slaptą kraujavimą, pacientas bus siunčiamas konsultuotis pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopinį tyrimą.